

# 带状疱疹ワクチン 予防接種について

带状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気です。体の左右どちらかの神経に沿って、痛みを伴う赤い発疹と水ぶくれが多数集まって带状疱疹に生じます。80歳までに約3人に1人が発症すると言われていています。

带状疱疹ワクチンは2種類あります。（助成はいずれか一方のみ）  
※助成がされるのは令和6年3月31日までです。

	不活化ワクチン	生ワクチン
接種対象者	50歳以上の者 又は、带状疱疹に罹患する リスクが高いと考えられる 18歳以上の者	50歳以上の者
接種方法	筋肉内接種	皮下接種
予防効果	9年以上	5年程度
頻度 (10%以上の副反応)	生ワクチンより多い 痛み (79.1%) 発赤 (37.4%) 腫れ (24.2%) 胃腸症状 (12%) 頭痛 (28.3%) 筋肉痛 (36.9%) 疲労 (34.6%) 悪寒 (21.4%) 発熱 (16.7%)	不活化ワクチンより少ない 発赤 (44%) 痒み (27.4%) 熱感 (18.5%) 腫れ (17%) 痛み (14.7%) 硬結 (13.5%)
接種回数	2回	1回
※別府市在住の方 接種費用 (助成適用後の費用)	1回につき 12,000円 2回で 24,000円	4,800円

お問い合わせは村橋病院まで

☎ 0977-23-3231